**INDICAZIONI PER
LA PREVENZIONE
DELLA
TRASMISSIONE DEL
COVID19**

Cosa sono i Coronavirus

Sono un'ampia famiglia di virus che provocano malattie respiratorie

Il Coronavirus responsabile di questa pandemia è denominato SARS-CoV-2

La malattia respiratoria provocata dal virus è denominata COVID19

Sintomi del COVID19

- Febbre (83% - 98%)
- Tosse secca (76% - 82%)
- Anosmia e ageusia (30%)
- Astenia e dolori muscolari (11% - 44%)
- Espettorato (33%)
- Dispnea (19%)
- Artralgia (15%)
- Faringodinia (14%)
- Cefalea (14 %)
- Diarrea e vomito (5%)

- L'80% dei pazienti ha sintomi lievi o moderati
 - Il 14% dei pazienti ha una malattia grave
 - Il 6% dei pazienti presenta un quadro critico
- In Italia, purtroppo, le percentuali indicano un tasso superiore.

- Periodo di incubazione mediano di 5 - 6 giorni
- Range da 1 a 14 giorni

Differenze fra influenza e COVID19

- L'influenza ha meno giorni di incubazione (3 giorni)
- L'influenza ha un tasso di contagio superiore nei primi giorni di malattia e nel periodo pre-sintomatico
- In generale il COVID19 ha un tasso di contagio superiore all'influenza (1/2,5 soggetti)
- I bambini sono un importante veicolo dell'influenza, non del COVID19

- Il COVID19 ha un tasso superiore di casi critici e di mortalità
- L'influenza è più rischiosa per bambini, donne in gravidanza, anziani e immunodepressi.
- COVID19 provoca maggiori danni ad anziani e a chi ha fattori di rischio (adipe viscerale) e malattie pregresse.
- Non disponiamo ancora di un vaccino per il virus del COVID19.

Vie di trasmissione

- Contatti stretti in ambienti chiusi per esposizione a goccioline di saliva o muco (droplets) emesse con tosse e starnuti.
- Contatto diretto o indiretto con le secrezioni, ad es. con le mani che toccano bocca e occhi.
- Trasmissione per via aerea (al di sopra di 1 metro) nel corso di procedure che generano aerosol.

Il rischio di contagio da un asintomatico è molto basso.

La trasmissione si verifica quando c'è un contatto stretto con un caso sintomatico (per più di 15 min, a distanza < di 2 metri).

Sopravvivenza del virus e disinfezione

I coronavirus vengono inattivati efficacemente da:

- Etanolo al 62 - 71%
- Perossido d'idrogeno allo 0,5%
- Ipoclorito di sodio allo 0,1%

Quanto il coronavirus resiste sulle varie superfici.

Lavaggio delle mani

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

0 Bagna le mani con l'acqua

1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2 friziona le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 Risciacqua le mani con l'acqua

9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

2 frizionare le mani palmo contro palmo

3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Caso sospetto

Persona con infezione respiratoria acuta con **almeno uno** di questi sintomi:

- febbre
- tosse
- dispnea

- Residente o in transito nelle zone infette

Che è stato a stretto contatto con un caso sospetto o confermato (coabitazione o solo contatto occasionale)

Livello I - Precauzioni standard

(d'ora in poi pazienti considerati sospetti o accertati)

Contesto:
Accoglienza senza
contatto ravvicinato

Pazienti:

- Igiene delle mani
- mascherina chirurgica

Operatori:

- Igiene delle mani
- Distanza di almeno 1 metro

Livello 2 - Precauzioni da contatto e droplets

Contesto:
Ambulatoriale

Pazienti:
Igiene delle mani
Risciacquo base
alcolica

Operatori:

- Igiene delle mani
- Copricapo
- Guanti
- Mascherina **chirurgica**
- Camice idrorepellente monouso
- Occhiali a maschera/
visiera

Livello 3 - Precauzioni con manovre che generano aerosol

Contesto:
Ambulatoriale

Pazienti:
Igiene delle mani
Risciacquo a base
alcolica

Operatori:

- Igiene delle mani
- Copricapo
- Guanti
- **FFP2** o equivalente
- Camice idrorepellente monouso
- Occhiali a maschera/
visiera

Sequenza di vestizione livello 2

Prima di indossare i dpi:

- Rimuovere gli effetti personali
- Indossare la divisa

Igiene delle mani

Indossare camice monouso non sterile idrorepellente a manica lunga

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di vestizione livello 2

Indossare una mascherina chirurgica e cuffia copricapo

Indossare occhiali a maschera o visiera

Indossare un paio di guanti in nitrile (elevata resistenza meccanica e chimica)

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di svestizione livello 2

Rimuovere il camice:

- Rompere o sciogliere i lacci
- Togliere il camice dal collo e dalle spalle
- Arrotolarlo con all'interno la parte esterna contaminata

Rimuovere i guanti, arrotolandoli senza toccare la cute

Sequenza di svestizione livello 2

Igiene delle mani con soluzione alcolica

Indossare un nuovo paio di guanti.

Rimuovere gli occhiali o visiera

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di svestizione livello 2

Rimuovere il copricapo

Rimuovere la mascherina

Rimuovere i guanti, arrotolandoli
senza toccare la cute

Igiene delle mani con
soluzione alcolica

- I dpi monouso vanno smaltiti nel contenitore per rifiuti infettivi
- I dpi multiuso vanno lavati e disinfettati

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di vestizione livello 3

Prima di indossare i dpi:

- Rimuovere gli effetti personali
- Indossare la divisa

Indossare soprascarpe

Igiene delle mani

Sequenza di vestizione livello 3

Indossare un primo paio di guanti

Indossare camice monouso non sterile idrorepellente a manica lunga, coprendo i guanti con il polsino del camice

Indossare un copricapo

Sequenza di vestizione livello 3

Indossare un filtrante FFP2 o FFP3 (un elastico sopra e uno sotto l'orecchio)

Indossare occhiali a maschera o visiera

Indossare un secondo paio di guanti, coprendo il polsino del camice

Sequenza di svestizione livello 3

Rimuovere il soprascarpe

Rimuovere il paio di guanti esterno

Sequenza di svestizione livello 3

Rimuovere il camice:

- Rompere o sciogliere i lacci
- Togliere il camice dal collo e dalle spalle
- Arrotolarlo con all'interno la parte esterna contaminata

Rimuovere i guanti interni arrotolandoli senza toccare la cute

Sequenza di svestizione livello 3

Igiene delle mani

Indossare un nuovo paio di guanti.

Rimuovere gli occhiali o visiera

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di svestizione livello 3

Rimuovere il filtrante
(prima l'elastico inferiore
e poi con il superiore
superare la fronte)

Rimuovere il copricapo

Rimuovere i guanti

Ausl - Reggio Emilia

Sequenza di svestizione livello 3

Igiene delle mani con
soluzione alcolica

- I dpi monouso vanno smaltiti nel contenitore per rifiuti infettivi
- I dpi multiuso vanno lavati e disinfettati

Ausl - Reggio Emilia

www.e-laber.it

IL primo e più importante livello di intervento è l'applicazione delle misure standard da applicarsi a tutte le strutture sanitarie, alle quali accedono pazienti e utenti di cui non sono note le effettive condizioni di salute

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro prevede l'attuazione di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art.15 del D.Lgs. 81/08) tra cui
“l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; l'utilizzo limitato degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

INAIL

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici - del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. : obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che comprende misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, informazione e formazione e di sorveglianza sanitaria. Tali misure vanno adottate in base alla valutazione dei rischi, valutando ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria.

I lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all'art. 20 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

INAIL prevede:

- FFP2 per il livello 2
- FFP3 per il livello 3

Fonti

- OMS
- ISS
- AUSL Emilia Romagna
- INAIL
- Medical Facts

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!