

INDICAZIONI IN ORTOGNATODONZIA PER FASE 2 COVID-19

Le INDICAZIONI ORTODONTICHE IN FASE 2 sono una sintesi rigorosa descritta nella letteratura scientifica dell'ortodonzia europea e dagli esperti dell'ortognatodonzia italiana, sulla base di:

- 1) Differente età media dei pazienti ortodontici, con conseguente profilo di rischio notevolmente inferiore (pazienti in crescita o giovani adulti epidemiologicamente meno esposti al contagio);
- 2) Tempistica media della visita di controllo ed operativa ridotta (VERDE);
- 3) Possibile impiego di aree cliniche "open plan", discretamente diffuso nella pratica clinica ortodontica, favorevole al distanziamento sociale, senza aerosol (VERDE); oppure uso dell'ambulatorio singolo per il paziente con aerosol (ROSSO)
- 4) L'ortodonzia è caratterizzata da timing terapeutico prolungato e l'assenza di controllo per più di due mesi può esporre i nostri pazienti a possibili danni biologici dento-parodontali
- 5) Impiego di strumenti rotanti e produzione di aerosol estremamente ridotto (ROSSO).

PIANIFICAZIONE AGENDA DEL TEAM ORTOGNATODONTICO E DELLA CONSULENZA:

Stabilire gli indici di priorità del paziente ortodontico, tenendo conto del grado di rischio delle procedure da adottare durante il nostro intervento alla poltrona nel corso della giornata, per la pianificazione dell'agenda degli appuntamenti da parte dell'odontoiatra (anche con l'utilizzo della videochiamata).

Utile nel corso della giornata la pianificazione del pulito verso lo sporco (dal VERDE al ROSSO) con diversificazione degli appuntamenti senza aerosol verso quelli con aerosol.



Pianificazione Agenda

- 1 - BONDING/DEBONDING, SPLINTAGGIO, ALLINEATORI CON AEROSOL**
- 2 - CONTROLLI COMPLESSI DI TERAPIA FISSA E ALLINEATORI SENZA AEROSOL**
- 3 - VISITE, CONTROLLI BREVI, DISPOSITIVI MOBILI E FISSI SENZA AEROSOL**

PIANIFICAZIONE DELL'AGENDA:

1. Pazienti in terapia attiva con allineatori (VERDE)
2. Visite e controlli brevi di dispositivi mobili e fissi – senza aerosol (VERDE)
3. Prime visite ortodontiche e preparazione della cartella ortodontica digitale (VERDE)
4. Nuovi pazienti che hanno già affrontato prima visita e diagnosi che attendono inizio trattamento ortodontico (VERDE)

5. Rotture/smarrimenti di apparecchi mobili o allineatori (VERDE)
6. Controlli complessi di ortodonzia fissa e di allineatori senza aerosol, preparazione di cartella ortodontica analogica (GIALLO)
7. Traumi determinati dalle apparecchiature fisse o mobili sui tessuti duri o molli (ROSSO)
8. Bandaggio, sbandaggio, splintaggi e gestione terapia ortodontica con allineatori – con aerosol (ROSSO)

PRECAUZIONI PREOPERATORIE

- Prima di ogni appuntamento ortodontico, il paziente deve presentarsi con un'igiene orale domiciliare estremamente scrupolosa.
- Sciacquare preventivamente con un collutorio antibatterico e antivirale per bambini di età superiore ai 6 anni. L'efficacia virucida dei collutori antisettici comunemente usati e la loro azione preventiva sulla trasmissione crociata non è stata ancora dimostrata, per cui sciacquo iniziale è facoltativo. Suggerimento: sputare direttamente nel bicchiere consegnato.
- Dove è necessario approfondimento diagnostico con Rx. È preferibile eseguire Rx extraorale per ridurre la secrezione salivare e non indurre tosse.
- Per evitare produzione di aerosol privilegiare la strumentazione manuale, l'uso di diga e l'utilizzo di doppia aspirazione nel caso di aerosol.

PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI SANITARI

L'utilizzo di mezzi di protezione (DPI) per gli operatori e per i pazienti viene rapportato rispetto alla complessità della prestazione da erogare.

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'ISS in materia di lavaggio delle mani
- Corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI:
 - A) *Guanti*: monouso su ogni paziente
 - B) *Divise dedicate*: sopra le proprie utilizzo di camici monouso: idrorepellenti in assenza di aerosol (VERDE), impermeabili in caso di prestazioni con aerosol (ROSSO).
 - C) *Mascherina chirurgica* da sostituire per singolo paziente (VERDE), e posizionata sopra la *mascherina FFP2/FFP3* da indossare per tutta la sessione ambulatoriale (fino a max 8 ore) (GIALLO --> ROSSO)
 - D) *Occhiali di protezione/Visiera di protezione*: da indossare
 - E) *Cuffia*: in prestazione senza aerosol, cuffia che ricopre capelli e orecchie (VERDE); in caso caso di aerosol, utilizzare cuffia che copre anche il collo (ROSSO)
 - F) *Copri-scarpe*: utilizzare i copri-scarpe solo in caso di produzione di aerosol (ROSSO).

È evidente che l'attività degli ortodontisti presso gli studi odontoiatrici prima di Covid-19 prevedeva la visita e il controllo ortodontico di un numero importante di pazienti durante la giornata lavorativa, inevitabilmente queste disposizioni modificheranno sensibilmente il modello di lavoro.

23 Aprile 2020

Giuliano Maino
Presidente SIDO

Paolo Manzo
Presidente AidOR

Giorgio Iodice
Presidente ASIO

Gianvito Chiarello
Presidente SUSO